



Till vårdnadshavare/elev

Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio – påfyllnadsdos

Barn ska erbjudas grundvaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med tre doser inom det första året. Påfyllnadsdos bör därefter ges för att ha ett fullgott skydd.

Varför bör man vaccinera mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio?	<p>Difteri är en allvarlig smittsam halsinfektion som kan orsaka kvävning. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på olika organ. Sjukdomen kan leda till dödsfall bland ovaccinerade.</p> <p>Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. Stelkrampsbakterien förekommer i jord och smuts. Risken för infektion finns alltid vid förorenade sårskador, även vid små sår.</p> <p>Kikhosta (pertussis) är en mycket smittsam luftvägssjukdom som ger långvarig, svår hosta. Den är farlig, ibland livshotande för spädbarn som oftast smittas av äldre syskon och/eller föräldrar.</p> <p>Polio är en smittsam infektionssjukdom som orsakar s.k. barnförlamning. Skadorna efter poliosjukdomen är bestående. Tack vare världsomfattande vaccinationsverksamhet mot polio så finns goda förhoppningar att sjukdomen kan utrotas. Det är mycket viktigt att ha ett fullgott skydd vid vistelse i länder där polio ännu inte försvunnit.</p>
Ger vaccination några besvär?	Besvär kan förekomma som måttliga lokala reaktioner, såsom kortvarig rodnad, svullnad, ömhet eller klåda.
Kan alla vaccineras?	Berätta om du/ditt barn är sjukt, har en underliggande sjukdom eller en allvarlig allergi, eller reagerade på något sätt i samband med en tidigare vaccination. Om du/ditt barn har nedsatt immunförsvar krävs särskild läkarbedömning. Har du/ditt barn en pågående infektion med feber skall man vänta med vaccinationen. Om ditt barn har drabbats av skada kan påfyllnadsdos mot difteri och stelkramp ha givits på sjukhus eller vårdcentral meddela i så fall detta.
Undantag	Enstaka barn kan efter tidigare vaccination mot stelkramp och difteri ha fått långvariga besvär av en kliande kula. Det kan bero på allergi mot något i vaccinet. Detta bör skolsköterskan få reda på före vaccinationstillfället. Om du/barnet åter vaccineras finns risk för att den kliande kulan återkommer eller att klådan förvärras.

Läs mer om vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta på folkhalsomyndigheten.se
Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten.



Samtycke till vaccination

Lämna blanketten senast:

Namn	Personnummer/LMA-nummer
Skola	Klass/Grupp

Inför vaccinationen ber vi dig också besvara frågorna i hälsodeklarationen nedan.

Ja, jag samtycker till vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos

Nej, jag samtycker inte till vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, påfyllnadsdos

Hälsodeklaration (Om du svarat nej till vaccination, behöver du inte svara):

Har du/ditt barn...

...i samband med en skada fått vaccination mot stelkramp och difteri?

Ja, år: Nej

...allvarlig allergi?

Nej Ja, vilken allergi? _____

...fått en allvarlig allergisk reaktion vid någon tidigare vaccination/injektion?

Nej Ja, vilken allergisk reaktion och av vad? _____

...någon allvarlig sjukdom eller regelbunden medicinering?

Nej Ja, vilken? _____

Vi gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna samtycket!

Datum:

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Telefon

Vaccinationer är frivilliga. Lämnas inte samtycke innebär det att ert barn inte kan vaccineras.